

DERALAN směs

Rodenticid ve formě směsi granulí a mořené zrna

Deralan G : REG -33.7. – 18.1.07. / 2336

Deralan Z : REG -33.7. – 18.1.07. / 2336

Nástraha na ničení škodlivých hlodavců (potkan, krysa, myš domácí) v uzavřených prostorech.

Složení: 100g přípravku obsahuje :

Bromadiolon 50 mg.l¹, tj. 0,005 % (EC 249-205-9)

Kukuřičný a pšeničný šrot, rybí moučka, pšeničné zrno, aromatické látky 99,995 %

Upozornění

JED NA HLODAVCE!

CHRAŇTĚ PŘED DĚTMI, NEPOUČENÝMI OSOBAMI A ZVÍŘATY!

Pro hospodářské, domácí a volně žijící zvířata nebezpečný!

Pro ryby a ostatní vodní živočichy mimořádně jedovatý!

Uložte mimo dosah zvířat!

POUŽÍVAT PODLE NÁVODU!

Mechanismus účinku

Snížení srážlivosti krve zamezením tvorby protrombinu.

Vlastnosti

Bromadiolon je hydroxykumarínový derivát druhé generace s antikoagulačním účinkem proti všem druhům hlodavců, včetně těch, které jsou rezistentní proti jiným rodenticidům. Působí na hlodavce smrtelně už po jednorázovém požití nástrahy. Deralan je hlodavci velmi dobře přijímaný.

Návod na použití

- **potkan a krysa:** Důležité je umístění nástrah na místa trvale navštěvované hlodavci. Nástrahy kladte v uzavřených sáčcích do jedových staniček nebo na podesty v kanalizační síti. Položené množství nástrah - hustota rozmístění těchto nástrah záleží na velikosti populace v daném objektu.

- **myš domácí:** nástrahy kladte do míst výskytu hlodavců. Vzhledem k tomu, že myši mají poměrně malý akční rádius, je potřebné instalovat jedové staničky s nástrahou dle velikosti populace hlodavců ve vzdálenostech 2 m až 10 m od sebe. Otrávení hlodavci hynou za 3 až 10 dní podle množství požitých latentních dávek.

Bezpečnostní opatření

Při kladení nástrah nejezte, nepijte, nekuřte! Používejte pracovní rukavice. Nástrahy kladte na místa tak, aby byly nedosažitelné pro domácí a hospodářské zvířata. Chraňte před dětmi.

S věty:

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S20/21 nejezte, nepijte a nekuřte při používání

S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn bezpečným způsobem

S36/37/39 Používejte vhodný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, nebo obličejový štít

S45 V případě nehody, nebo jestli se necítíte dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jestli je to možné, ukažte toto označení)

První pomoc

Po požití přípravku vypláchněte důkladně ústa vodou, vypijte 0,3 litru vlažné vody nevyvolávejte zvracení. Urychleně vyhledejte lékařskou pomoc! po kontaminaci očí - tyto vyplachovat proudem čisté vody po dobu aspoň 10 minut. Přivolat lékaře!

Po kontaminaci pokožky - tuto umýt teplou vodou a mýdlem.

Při podezření na otravu přivolat lékaře, kterého informujte o přípravku (bromadiolon - způsobuje krvácení) a poskytnuté první pomoci. Léčení postiženého je možné konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem v Praze, telefon 224 91 92 93**

Informace pro lékaře: **Antidotum vitamín K**

Skladování

Skladovat na suchém místě mimo dosah dětí a zvířat, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků, dezinfekčních prostředků, jiných chemických látek a obalů od těchto látek.

Likvidace obalů

Obaly po důkladném vyprázdnění spalte v schválené spalovně.

Výrobce : DeArt s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice

Distributor : SLOM s.r.o. Zlín, Příluky, Staromlýnská 47 Zlín 760 01

Telefon : +420577431128 , **Fax** : +420577218701 , **E-mail** : slom@slom.cz

Balení a obsah

Kategorie použití: Papírové nebo PE pytle o hmotnosti 20 kg

Datum výroby :

Číslo šarže :

Oznámeno dle § 35 Zákona č. 120/2002 Sb., pod.č.j. MZDR66012/2011/SOZ

Povoleno pro používání v potravinářských provozech pod č. 77/2011 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno.